

Bệnh sùi mào gà dấu hiệu, nguyên nhân và phương pháp phòng tránh

Sùi mào gà còn được liên lạc là bệnh mồng gà hay bệnh mụn cóc sinh dục. Đây là chủng bệnh hoa liễu, lây truyền rất nhiều trong đường hoạt động tình dục không đảm bảo, hết sức phổ biến qua xã hội hiện giờ. Vi rút gây sùi mào gà là Human Papillomavirus (HPV). Căn vi rút này đang có tầm 120 chủng, trong đó có 40 căn là nguyên nhân gây bệnh thông trong con đường hoạt động tình dục. HPV-16 cùng với HPV-18 là tác nhân gây sùi mào gà ở 90% trường hợp bị mắc bệnh.

Sùi mào gà xuất hiện ở cả nam giới và nữ giới song theo thống kê thì nữ giới có tỷ lệ bị bệnh cao hơn. Nguyên do bởi nữ giới đều đón nhận tinh dịch của nam lúc quan hệ tình dục và môi trường âm đạo cũng tạo điều kiện tốt cho căn viêm nhiễm này phát triển. Bên ngoài quan hệ tình dục không an toàn, bệnh còn sẽ lây truyền vì những nguyên do như lan từ mẹ sang con hoặc ứng dụng chung đồ sử dụng cá nhân cùng bệnh nhân.

Lúc có những hiện tượng lạ nghi ngờ bệnh sùi mào gà, tốt bạn cần tới [địa chỉ chữa bệnh sùi mào gà uy tín](#) chuyên khoa uy tín để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, kiểm tra trực tiếp.

Bệnh sùi mào gà là gì?

Bệnh sùi mào gà, hoặc bệnh mụn cóc sinh dục, bệnh mào gà, là một bệnh lan truyền lây truyền qua đường tình dục rộng rãi bởi vì vi rút dẫn đến, cùng với dấu hiệu là những nốt sùi mềm vừa rồi bộ phận nhạy cảm kèm theo đau, ngứa, khó chịu. Vi rút gây sùi mào gà là Human Papillomavirus (HPV).

Một số người xuất hiện bệnh mụn cóc sinh dục trong tầm vài tuần sau khi nhiễm bệnh, tuy nhiên cũng đã có tình huống vài tháng hay vài năm. Có khi, phần lớn những mức độ lây nhiễm HPV chưa có dấu hiệu hay không được nhận ra. Tỷ lệ người có triệu chứng rõ rệt cực kỳ thấp, chỉ cỡ 1-2% mức độ. Do vậy mà người bệnh vô cùng khó xác định tình huống của mình cùng vô tình lây vi khuẩn cho người khác lạ.

Các dạng khuẩn gây bệnh sùi mào gà

Virus gây bệnh sùi mào gà là Human Papillomavirus (HPV). Căn viêm nhiễm này gồm khoảng 150 kiểu cùng với ít nhất 30-40 kiểu truyền trong con đường quan hệ tình dục. Song chỉ một số loại có thể tạo ra bệnh sùi mào gà. Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, có hai nhóm phổ biến gây ra hai tình huống sùi mào gà gồm:

Căn HPV-16 cùng với HPV-18 thuộc nhóm khả năng cao, có khả năng gây ung thư cổ tử cung, dương vật, âm hộ, âm đạo, hậu môn, hầu họng...

Dạng HPV-6 cùng HPV-11 thuộc nhóm lành đặc tính. Nhưng, bệnh sùi mào gà khổng lồ (u Buschke-Lowenstein) vô cùng hiếm thấy và được xem là một chủng của ung thư biểu mô tế bào vảy căn nhú vì HPV 6 và 11 gây căn phải. Bệnh có bản chất là xâm lấn xuống dưới trung bì. Bệnh học đang có những khu vực lành tiêu chí xen kẽ những tế bào thượng bì bất bình thường hay những tế bào biệt hóa ung thư tế bào vảy (SCC).

Lý do gây sùi mào gà kín

Vi rút Human Papillomavirus (HPV) là tác nhân dẫn đến bệnh sùi mào gà kín. Kiểu vi khuẩn này gồm tầm 150 chủng cùng với ít nhất 40 dạng lan trong con đường quan hệ tình dục. Trong đó, 2 dạng phổ biến gây bệnh sùi mào gà là HPV-16 cùng HPV-18 thuộc nhóm nguy cơ cao, bởi có nguy cơ gây ung thư cổ tử cung, dương vật, âm hộ, âm đạo, hậu môn, hầu họng... căn HPV-6 cùng với HPV-11 cũng sẽ gây ra sùi mào gà, u nhú con đường hô hấp phát lại, tuy nhiên lại không tiến triển thành ung thư.

Các yếu tố nguy cơ của bệnh sùi mào gà:

Đa phần người có quan hệ tình dục luôn sẽ bị truyền khuẩn ở một thời gian nào đó qua đời. Ngoài ra, các yếu tố có thể làm nâng cao nguy cơ bị truyền nhiễm bệnh bao gồm:

Quan hệ tình dục không có trang thiết bị bảo vệ

Quan hệ tình dục nếu như không biết tiền sử tình dục của bạn tình

Đã có hầu như bạn tình

Lây nhiễm những bệnh lan truyền trong đường tình dục khác

Hoạt động tình dục sớm

Hệ miễn dịch kém như lây truyền HIV hay áp dụng thuốc chống thải ghép

Người dưới 30 tuổi

Người hút thuốc lá

Đã có mẹ bị truyền nhiễm khuẩn HPV

Các biểu hiện bệnh sùi mào gà

Dấu hiệu bệnh sùi mào gà tại nữ

Bệnh sùi mào gà là một dạng bệnh nhiễm trong đường tình dục, tại vì khuẩn gây u nhú ở người (HPV) gây nên. Biểu hiện bệnh sùi mào gà ở nữ có thể lạ nhau phụ thuộc vào mức độ, sau là một số biểu hiện đều gặp:

Hình thành các vết sùi: những vết sùi nhỏ nổi lên ở vùng kín hoặc xung quanh, thường xuyên có màu hồng hay da, hình thù cũng như cụm sùi của bông cải hay mào gà. Vết sùi có thể mọc đơn lẻ hay thành nhóm.

Sùi mào gà gây ngứa và khó chịu: Nữ giới bị bệnh sùi mào gà đều cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu ở vùng sinh dục, đặc biệt lúc những vết sùi phát triển và lây nhiễm rộng.

Sưng và đau: nếu bị mắc nhiễm sùi mào gà, vùng kín có thể sưng đỏ cùng cảm giác đau nhức, gây khó khăn trong quy trình đi tiểu hoặc sinh hoạt tình dục.

Xảy đến chảy máu: những vết bệnh sùi mào gà nếu mắc thương tổn có thể chảy máu, tuyệt nhiên sau khi sinh hoạt tình dục hoặc nếu vệ sinh khu vực sinh dục.

Âm đạo bài tiết ra chất nhầy: Nữ giới bị lan nhiễm sùi mào gà ở âm đạo thường xuyên gây ra vùng nhiễm trùng, đang có triệu chứng âm đạo tiết ra chất nhầy bất thường cùng màu sắc, độ đặc cùng mùi hôi khác thường.

Những nốt sùi sẽ xuất hiện ở ấu phần bên ngoài của âm hộ, bên trong âm đạo, cổ tử cung hay vùng hậu môn.

Lúc nhìn thấy triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh sùi mào gà, cần phải tìm đến [phòng khám đa khoa uy tín ở Hà Nội](#) để được khám cùng với trị đúng lúc. Vấn đề ứng dụng các phương thức bảo vệ đảm bảo trong quan hệ tình dục cũng giúp giảm khả năng lan sùi mào gà cùng các bệnh lây truyền trong con đường tình dục khác.

Hiện tượng bệnh sùi mào gà ở nam

Sau đây là một vài hiện tượng và hiện tượng thường xuyên thấy ở nam giới:

Hình thành nốt sùi: Một trong các triệu chứng trước tiên cũng rõ ràng nhất của sùi mào gà là sự hình thành của các vết sùi, thường xuyên đã có hình căn như chùm, cụm thịt đang có màu hồng hoặc màu da. Chúng thường xuyên mọc tại khu vực bìu, quy đầu, dọc theo thân cậu nhỏ, lỗ niệu đạo, hậu môn hay vùng da giữa hậu môn cùng với bìu cậu nhỏ..

Ngứa ngứa cùng khó khăn chịu: một số nam giới bị bệnh sùi mào gà đều thấy ngứa ngứa và khó ngủ tại khu vực nhạy cảm hoặc bên cạnh lỗ niệu đạo.

Đau khi sinh hoạt tình dục: sùi mào gà sẽ khiến hoạt động tình dục trở nên phải đau và khó chịu tại vì những vết sùi hình thành bên trên đầu hoặc thân dương vật, bao da quy đầu, bìu,...

Chảy máu: trong một số trường hợp, bệnh sùi mào gà có thể tạo ra ra máu khi chúng mắc vết thương hay dẫn đến thương tổn hở qua quy trình hoạt động tình dục.

Sưng, đỏ tại khu vực sinh dục: một số người có thể cảm thấy vùng sinh dục mắc sưng và đỏ ửng bởi bệnh sùi mào gà gây ra những ổ virus hoặc nhiễm trùng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh sùi mào gà có thể chưa có các triệu chứng rõ hoặc không dễ phát hiện đối với cả bệnh ở nam giới cùng với nữ giới. Do vậy, vấn đề thăm xét nghiệm kỹ do những bác sĩ y tế cùng tiến hành khám là hết sức quan trọng để cảm nhận chính xác và cách điều trị kịp lúc.

Tác nhân bệnh sùi mào gà

Viêm nhiễm HPV gây bệnh sùi mào gà

Vi rút HPV (Human Papillomavirus) là nhiễm trùng gây u nhú tại người, là một trong các kiểu nhiễm trùng lây nhiễm qua đường tình dục rộng rãi nhất. HPV là lý do chính tạo ra bệnh sùi mào gà, một bệnh lây nhiễm qua con đường tình dục luôn bắt gặp.

Nếu virus HPV tấn công đi tới cơ thể, chúng sẽ tấn công những tế bào da cùng dẫn đến quá trình biến đổi bộ gen di lan nhiễm của chúng. Điều này sẽ hình thành trường hợp tăng sinh tế bào da cùng với dẫn đến các khối u tuyến tiền liệt (sùi mào gà) ở vùng nhạy cảm và các vùng da bất thường

nêu trên khắp cơ thể.

Những yếu tố nguy cơ cao bị sùi mào gà gồm có:

Những đối tượng sinh hoạt tình dục cùng với số nhiều bạn tình: Người đang có rất nhiều đối tác tình dục có khả năng bị mắc nên bệnh sùi mào gà cao hơn so cùng người thông thường. Do con đường tình dục là đường lây lan viêm nhiễm HPV – nguyên do chính dẫn đến bệnh sùi mào gà và các bệnh tình dục lạ phổ biến nhất.

Các đối tượng bị mắc suy giảm hệ miễn dịch: Người đã có hệ miễn dịch yếu bởi vì đã có bệnh nền hay người đang tiến hành cách chữa bằng các thuốc ức chế miễn dịch.

Các đối tượng là trẻ em đang có hệ miễn dịch chưa được hoàn thiện cũng là nhóm thành phần nguy cơ cao mắc lan truyền HPV cũng dẫn đến bệnh sùi mào gà.

Những thành phần mắc các bệnh xã hội bất thường như Chlamydia sẽ làm tăng khả năng lan HIV nếu đang có phơi lây truyền, khiến hệ miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho HPV tấn công cùng với gây hại; lậu (Gonorrhea), bệnh giang mai (Sifilis) cũng có thể dẫn đến những chứng khuẩn, thúc đẩy quá trình lây cùng phát triển của vi khuẩn HPV, do đó khiến người có bệnh dễ mắc sùi mào gà hơn.

Những đối tượng dùng hay lạm dụng chất kích thích như thuốc lá và cồn: Hút thuốc lá cùng với uống rượu bia số nhiều khiến cơ thể mất cân bằng, hệ miễn dịch giảm sức đề kháng và đơn giản mắc lan truyền HPV cùng với bị sùi mào gà.

Ứng dụng chung đồ vệ sinh cá nhân: ứng dụng chung đồ làm sạch cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm rửa, bàn chải đánh răng,... với người bị mắc sùi mào gà sẽ lây truyền bệnh.

Những thời điểm phát triển của bệnh sùi mào gà

Bình thường, bệnh sùi mào gà có thể phát triển cùng với diễn tiến theo 5 thời kỳ chính sau:

Giai đoạn ủ bệnh: Đây là giai đoạn bắt đầu khoảng lúc người bị bệnh chạm cùng với mầm bệnh cho tới nếu như bệnh khởi phát. Nếu như HPV xâm nhập đi tới cơ thể, vi rút có thể xuất phát bám đến những tế bào, khiến những tế bào bị mắc biến đổi gen, làm chúng quan hệ bất bình thường, không chết đi theo đúng chu kỳ và nhân lên ngay lập tức. Tại thời gian

này người bệnh sùi mào gà đều không có dấu hiệu rõ bệnh. Giai đoạn ủ bệnh của sùi mào gà sẽ diễn ra trong vài tuần, vài tháng hay thậm chí là vài năm tùy thuộc vào trường hợp thể trạng của đã từng người. Trung bình, giai đoạn này đều kéo dài tầm 2 tới 9 tháng và rộng rãi nhất là 3 tháng.

Giai đoạn khởi phát: Đây là thời kỳ xuất hiện các triệu chứng trước hết của bệnh sùi mào gà. Thường bắt đầu với sự xuất hiện của những vết sùi mào nhỏ, rải rác, thưa thớt.

Giai đoạn phát triển: qua thời điểm này, bệnh sùi mào gà tiếp tục phát triển và số lượng vết sùi mào gà ngày càng tăng lên nêu trên bề mặt da hoặc niêm mạc và phát triển thành những hạt lớn hơn dẫn tới mào gà. Điều này thực hiện ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục, làm sạch cá nhân cùng với cặp khi gây lo lắng, mặc cảm cho người có bệnh.

Giai đoạn biến chứng: Đây sẽ được coi là thời gian cuối của bệnh sùi mào gà. Lúc không được chữa trị kịp thời điểm, bệnh sùi mào gà sẽ dẫn đến những hệ lụy như quá trình lan nhiễm của vết bệnh sùi mào gà đến những cơ quan lạ như khu vực hậu môn, vòm họng hoặc cổ tử cung tại người phụ nữ, dẫn đến ung thư cổ tử cung. Trong thời gian này, người mắc bệnh còn xuất hiện mức độ bội lây truyền, khu vực vết thương vì sùi mào gà dẫn đến bị tiết dịch, lở loét, sung tấy, dễ ra máu,...

Thời điểm tái phát: khi đã cách chữa, sẽ bệnh sùi mào gà có thể không triệt để biến mất. Một vài người có thể bắt gặp sự phát lại của bệnh, tuyệt đối là nếu như hệ thống miễn dịch bị mắc suy giảm hay nếu như cơ thể sờ lại cùng viêm nhiễm HPV bởi vì thói quen hoạt động tình dục kém bảo đảm.

Các người bị mắc bệnh sùi mào gà cần phải được điều trị đúng hình thức để kiểm chế nguy cơ phát lại cùng với hệ lụy. Hơn nữa, vấn đề áp dụng cách ngăn ngừa như bảo vệ trong sinh hoạt tình dục, tiêm dạng vaccine HPV, giữ làm sạch vùng sinh dục cũng hết sức cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ truyền bệnh.

- [Chi phí khám sùi mào gà](#)
- [Chat lương phong kham Thai Ha](#)

Sùi mào gà đang có nguy hiểm không?

Sùi mào gà là một qua những bệnh vô cùng không tốt, cùng nguy cơ lây nhiễm nhanh chóng, khiến cho người có bệnh thấy cực kỳ cảm giác đau, khó ngủ, tự ti... lúc không được phát hiện sớm cùng với cách điều trị kịp

lúc, đúng quy trình, bệnh sẽ để lại phần lớn biến chứng nguy hại, ảnh hưởng đến thể trạng cùng khả năng sinh sản của bệnh nhân. Chi tiết như:

Phát triển thành ung thư

Bệnh sùi mào gà có khả năng gây bệnh ung thư ở cả nam lẫn nữ. Những kết quả thống kê cho thấy, tầm 10,2% phụ nữ bị bệnh sùi mào gà ở cổ tử cung, 5% tại âm đạo, 5% ở hậu môn có thể phát triển thành ung thư. Ở nam giới, 15% trường hợp truyền nhiễm trùng HPV chuyển thành ung thư cậu nhỏ.

Người nhiễm bệnh cũng sẽ bị mắc ung thư vòm họng, cổ họng... nếu mắc bệnh sùi mào gà bởi đã có hoạt động tình dục bằng con đường miệng.

Ảnh hưởng đến thai kỳ

Trong quy trình có bầu, nồng độ hormone trong cơ thể của chị em phụ nữ tăng cao. Đây là nguyên nhân khiến cho những nốt sùi to lên, lây nhiễm rộng hơn cùng với gây chảy máu. Những nốt bệnh sùi mào gà không những gây khó khăn cho vấn đề đi đại tiện là do kích cỡ tăng dần, mà còn sẽ tiến hành kiểm chế quá trình co giãn của mô âm đạo, ảnh hưởng tới quy trình sinh nở dân gian, khiến cho thai phụ khó sinh bằng ngả âm đạo.

Mặc dù vô cùng hiếm thấy, ở 4/100.000 trẻ sinh ra sống, nhưng một số trẻ sơ sinh đang có mẹ bị sùi mào gà cũng có nguy cơ mắc u nhú thanh quản khiến cho trẻ khàn giọng, khóc yếu... qua mức độ nặng bệnh sẽ truyền sang khí quản, phổi, gây tắc nghẽn đường thở.

Ảnh hưởng nguy cơ sinh sản

Bệnh sùi mào gà có thể làm biến loại dương vật, tắc nghẽn ống dẫn tinh, tắc niệu đạo, ung thư cổ tử cung... tác động đến nguy cơ sinh sản của cả hai giới. Một số tham khảo còn cho biết, quá trình xuất hiện của nhiễm trùng HPV qua tinh dịch tiến hành giảm nguy cơ di chuyển của tinh trùng, có thể gây vô sinh ở nam. Nếu như tinh trùng chứa HPV thụ tinh cùng với trứng cũng sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai.

Thời gian phát triển của bệnh sùi mào gà

Theo thực hiện phát triển của sùi mào gà, nhiều bác sĩ chuyên khoa chia bệnh thực hiện 5 thời điểm tương ứng cùng các triệu chứng dưới đây:

Thời gian ủ bệnh: Đây là thời kỳ người nhiễm bệnh chạm cùng với mầm bệnh cho tới nếu xuất hiện vết sùi trước tiên. Tầm thời điểm này có thể vài tuần, vài tháng hoặc lên đến vài năm. Thông thường là khoảng 3 tháng.

Thời kỳ khởi phát: Hiểu một giải pháp đơn giản, đây là sùi mào gà thời gian đầu. Bệnh nhân xuất hiện vết sang thương nhỏ, màu nhạt, nằm rải rác...

Thời gian phát triển: ở giai đoạn này, các vết sùi phát triển mạnh về kích cỡ, số lượng, vị trí... tác động chủ yếu đến tinh thần cùng quy trình quan hệ.

Thời điểm biến chứng: trong tự nhiên, đây được liên lạc là sùi mào gà thời điểm cuối. Người mắc bệnh có hiện tượng bội truyền, khu vực bị vết thương bị sưng tấy, bài tiết dịch, loét, dễ xuất huyết. Một số người có biến chứng sang ung thư hậu môn, vòm họng...

Giai đoạn tái phát: sau khi trị khỏi, người bệnh vẫn có nguy cơ phát lại tâm chính người bạn tình hoặc bởi vi khuẩn trong cơ thể chưa được loại bỏ khỏi hẳn. Thông thường, tình huống của người mắc tái diễn sùi mào gà sẽ nặng hơn nguyên phát.

Nhận diện bệnh sùi mào gà

Nhận thấy sùi mào sẽ giúp cho người bị bệnh chủ động nắm bắt được mức độ bị bệnh của bản thân nhằm kịp lúc tiếp nhận các phương pháp trị khoa học ở thời gian đầu, giúp cho kết quả chữa bệnh được tối ưu. Sẽ nhận thấy bệnh sùi mào gà thông qua một số hiện tượng bên trên lâm sàng sau:

Hình thành các u nhỏ màu hồng hay màu da, dẫn đến thành nhọt nước hay nổi thành đã từng nhóm, luôn tương tự như cụm sùi. Các u này luôn hình thành tại vùng sinh dục, gồm có cơ quan nhạy cảm, hậu môn, môi, miệng cùng lưỡi, dẫn đến đau đớn đớn, ngứa ngáy hoặc nóng nực tại vùng đang có các u, cặp khi có ra máu, tuyệt nhiên là lúc sinh hoạt tình dục. Bác sĩ sẽ kiểm tra bằng mắt luôn để phát hiện các dấu hiệu này.

Áp dụng tinh thể axit axetic: chuyên gia sẽ dùng tinh thể axit acetic nhằm làm sáng các vùng bị mắc lan nhiễm sùi mào gà. Khi chạm cùng cụm mụn, tinh thể này có thể biến nhọt trở nên trắng sáng, giúp cho nhận thấy nhanh chóng hơn. Có thể bôi lên và để bên trên bề mặt da tầm 2 tới 5 phút, riêng với hậu môn là tầm 15 phút nhằm tinh thể có thể bổ sung tác dụng.

Lấy mô bệnh phẩm: khi những biện pháp nêu trên không chính xác hay chưa đáp ứng, bác sĩ có thể lấy trực tiếp một mẫu mô tầm các khu vực bị mắc lây sùi mào gà (nốt mụn, u nhú,...) để đưa đi đến phòng thí nghiệm, phân tích và đánh giá bằng kính hiển vi nhằm xem bên qua những vết sùi gồm có vi rút dẫn tới bệnh sùi mào gà hay không? Bệnh đang diễn biến tại

thời điểm nào?.

Khám máu: khám này được áp dụng cùng với những thành phần đang nghi ngờ bản thân bị mắc sùi mào gà nhưng chưa xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt. Mẫu máu của đối tượng được đem đi khám tìm kiếm sự hiện diện của khuẩn HPV.

Xét nghiệm mẫu dịch: viêm nhiễm gây sùi mào gà có thể nơi trú qua dịch tiết của người mang bệnh, chẳng hạn như dịch âm đạo tại nữ giới cùng với dịch niệu đạo ở nam), cần phải vấn đề xét nghiệm mẫu dịch có thể xác định được mức độ lan nhiễm cùng diễn biến của bệnh.

HPV Cobas – Test: phương án này lấy một mẫu tế bào đã chết tại cổ tử cung nữ giới nhằm tiến hành kiểm tra tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung cùng với tiến hành các kiểm tra tìm kiếm sự hiện diện của vi rút HPV cùng với một nếu như. Kỹ thuật khám HPV Cobas – Test có độ nhạy nhìn thấy bệnh cùng với viêm nhiễm gây bệnh cực kỳ cao có thể lên tới 90-95%.

Khám PCR xác định type HPV: phương thức nhận thấy này giúp bác sĩ tư vấn xác định bệnh nhân đang có lây HPV gây sùi mào gà hoặc không? Nếu như có, xác định được HPV gây bệnh thuộc type nào? Kiểm tra này được thực thi thông qua mẫu bệnh phẩm được lấy trong cổ tử cung, âm đạo hay mảnh sinh thiết ở cổ tử cung nữ giới, mẫu niệu đạo/ dịch niệu đạo ở bệnh ở nam giới.

Nếu như nhìn ra bệnh sùi mào gà cỡ bất kể phương thức nào, chuyên gia chuyên khoa có thể đưa ra cách thức điều trị thích hợp, tùy theo trường hợp cùng với trường hợp của bệnh.

- [Khám bệnh xã hội ở đâu uy tín](#)
- [Hút thai ở đâu](#)